

## Odporúčanie k biologickej ochrane viníc

### Situácia

V súčasnom období sa vinice nachádzajú vo fáze 4. až 6. listu. Rast a vývoj viniča je oproti minulému roku z dôvodu vyšších teplôt posunutý dopredu minimálne o dva až tri týždne. Tento týždeň boli naplnené sumy efektívnych teplôt 170 °C potrebných na vyzrievanie oospór peronospóry viniča.

Lokálne sa na listoch viniča nachádzajú tiež poškodenia od vlnovníka viničového a háľkocov.

V nasledujúcom období odporúčame previesť preventívne ošetrovanie proti múčnatke viniča a peronospóre viniča.



### Múčnatka viniča (*Erysiphe necator*)

Na viničoch zatiaľ nie sú pozorované viditeľné výskyty mycélií múčnatky viničovej. Odporúčame urobiť preventívne ošetrovanie, ktoré má zároveň aj akaricídny účinok.

#### Odporúčané ošetrovanie:

- **Síra BL 2,5 kg/ha + WETCIT 0,1 %**

**Dávka vody 250 l/ha**

**Odporúčame následné použitie práškovej síry SOLFEX v dávke 10 kg/ha**

## Peronospora viniča (*Plasmopara viticola*)

Z dôvodu vysokých teplôt posledného obdobia boli tento týždeň boli naplnené sumy efektívnych teplôt 170 °C potrebných na vyzrievanie oospór peronospóry viniča. Zrážky tohto týždňa môžu lokálne vytvárať podmienky na splnenie primárnych infekcií. Preto je vhodné urobiť preventívne ošetrovanie proti peronospóre viniča a stimulovať rastliny k tvorbe vlastných obranných látok.

### Odporúčané ošetrovanie:

- **Memcomba 0,75 l/ha + FERTIPEN C 0,5 l/ha + WETCIT 0,1 %**

Dávka vody 250 l/ha

## Kontakty

Ing. Dominika Mikušová

Obchodný zástupca a poradca

+421 917 352 722

[mikusova@biocont.cz](mailto:mikusova@biocont.cz)

**Upozorňujeme, že konečné rozhodnutie o zvolenej variante ochrany musí urobiť vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok v konkrétnej vinici.**