

<b>Cibuľová z.</b>	<b>šetrné/EPV</b>	<b>produkt</b>	<b>účel použitia</b>	<b>Dávka</b>	<b>dávka vody</b>	<b>kedy</b>	<b>max.p. ap.</b>	<b>interval m. ap.</b>
<b>cibuľa, cesnak</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Nema-care-bioagens	molička/kvetárka	5mil./10m <sup>2</sup>	1l/10m <sup>2</sup>	máj-september	4x	14 dní
<b>listová z.</b>	<b>šetrné/EPV</b>	<b>produkt</b>	<b>účel použitia</b>	<b>Dávka</b>	<b>dávka vody</b>	<b>kedy</b>	<b>max.p. ap.</b>	<b>interval m. ap.</b>
<b>repa obyčajná</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>šalát</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Vitisan-fungicíd	múčnatka	3kg	500-1000l/ha	od prvého mladého listu po staré listy	10x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>špenát</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	5mil./10m <sup>2</sup>	1l/10m <sup>2</sup>	máj-september	4x	14 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky	3l/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>čakanka</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>valeriána</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>struková z.</b>	<b>šetrné/EPV</b>	<b>produkt</b>	<b>účel použitia</b>	<b>Dávka</b>	<b>dávka vody</b>	<b>kedy</b>	<b>max.p. ap.</b>	<b>interval m. ap.</b>
<b>fazuľa</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>hrach</b>	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní

hlúbková z.	šetrné/EPV	produkt	účel použitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.
<b>kapusta</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Trichoplus-bioagens	mora kapustová	50-100 kapsúl	<del>300-800l/ha</del>	od začiatku náletu do 3 dní	2x	10 dní
	<b>šetrné</b>	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, piliarky, molica	3l/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
	<b>EPV</b>	Nema-care	kvetárka	5mil./10m <sup>2</sup>	1l/10m <sup>2</sup>	máj-september	4x	14 dní
	<b>EPV</b>	Tradebor Mo	hnojivo	5l/ha	min 150l/ha	2 týždne po výsadbe	2x	10-15 dní
<b>kel hlávkový</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>kel ružičkový</b>	<b>šetrné</b>	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, piliarky, molica	3l/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>karfiol</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>brokolica</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>kareláb</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>Koreňová z.</b>	<b>šetrné/EPV</b>	<b>produkt</b>	<b>účel použitia</b>	<b>Dávka</b>	<b>dávka vody</b>	<b>kedy</b>	<b>max.p. ap.</b>	<b>interval m. ap.</b>
<b>mrkva</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	,5kg/ha(0,25%	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
	<b>EPV</b>	Nema-care	vítavka mrkvová	5mil./10m <sup>2</sup>	1l/10m <sup>2</sup>	máj-september	4x	14 dní
	<b>EPV</b>	Tradebor Mo	hnojivo	3-5l/ha	min 150l/ha	pri dostatočnej listovej ploche	3x	10-15 dní

<b>petržlen</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevencia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní
<b>paštrnák</b>	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
<b>hadomor</b>	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
<b>chren</b>	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
<b>zeler</b>	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní
<b>red'kev</b>	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
<b>lepinox len pre red'kovku</b>	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní
<b>cvikla</b>	<b>šetrné</b>	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní
<b>kukurica cukrová</b>	<b>šetrné/EPV</b>	<b>produkt</b>	<b>účel použitia</b>	<b>Dávka</b>	<b>dávka vody</b>	<b>kedy</b>	<b>max.p. ap.</b>	<b>interval m. ap.</b>
	<b>EPV</b>	Trichoplus-bioagens	vijačka, mora gamma	100 kapsúl	<del>300-800l/ha</del>	od začiatku náletu do 3 dní	4x	10 dní
	<b>EPV</b>	Tricholet-bioagens	vijačka, mora gamma	4-6g/ha	<del>300-800l/ha</del>	od začiatku náletu do 3 dní	4x	9 dní
	<b>EPV</b>	Lepido-insekticíd	vijačka, mora gamma	0,5-1kg/ha	400-1000l/ha	7-10 dní po nálete/v čase liahnutia	8x	7 dní
	<b>EPV</b>	Tradebor Mo	hnojivo	2-3l/ha	min 150l/ha	vo fáze 4-6 listov	1x	
<b>Mak siaty</b>	<b>šetrné/EPV</b>	<b>produkt</b>	<b>účel použitia</b>	<b>Dávka</b>	<b>dávka vody</b>	<b>kedy</b>	<b>max.p. ap.</b>	<b>interval m. ap.</b>
	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevencia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní

Plodová z.	šetrné/EPV	produkt	účel použitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.
<b>paprika</b>	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní
	EPV	Trichoplus-bioagens	sivkavec	100-200 kapsúl	<del>300-1000l/ha</del>	od začiatku náletu do 3 dní	2x	10 dní
	EPV	Rizocore	hnojivo	50g/ha	<del>300-1000l/ha</del>	1-pred sejbou do pôdy/2-závlahou	2x	4-6 týždňov
	EPV	Fertipen C-hnojivo	škvritosť	2l/ha	300-600l/ha	od fázy 5.listu po zber	3x	7 dní
	EPV	Tradecorp Fe	chloróza	100-250g/ha max 1kg	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rastu	4x	7-10 dní
<b>rajčiak</b>	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	šetrné	Vitisan-fungicíd	múčnatka	1,5-3kg	600-1200l/ha	od fázy 1.pravého listu	6x	7-10 dní
	šetrné	Spintor-insekticíd	strapky	0,04%	600-800l/ha	ihneď po vyliahnutí húseníc	2x	10 dní
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
	EPV	Tradecorp Fe-hnojivo	chloróza	100-250g/ha max 1kg	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rastu	4x	7-10 dní
	EPV	Tradebor Mo-hnojivo	hnojivo	5l/ha	min 150l/ha	prvá aplikácia 2 týž.po výsadbe a po kvete	2-3x	10-15 dní
<b>uhorky</b>	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,015%)	600l/ha	od fázy 3. pravého listu po 70% dozretých plodov	4x	6-8 dní
	EPV	Tradecorp Fe	chloróza	100-250g/ha max 1kg	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rastu	4x	7-10 dní
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	3-5l/ha	min 150l/ha	pred kvetom	3x	10-14 dní

<b>dyňa, melón</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Fertipen S-hnojivo	hnojivo s obsahom S	6l/ha		od fázy 5. listu	6x	7-14 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Tradebor Mo	hnojivo	3-5l/ha	min 150l/ha	pred kvetom	3x	10-14 dní
<b>tekvica</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Vitisan-fungicíd	múčnatka	1,5-3kg	600-1200l/ha	od fázy 1.pravého listu	6x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>cuketa</b>	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
<b>zemiaky</b>	<b>šetrné/EPV</b>	<b>produkt</b>	<b>účel použitia</b>	<b>Dávka</b>	<b>dávka vody</b>	<b>kedy</b>	<b>max.p. ap.</b>	<b>interval m. ap.</b>
	<b>EPV</b>	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	<b>šetrné</b>	Flowbrix-fungicíd	pleseň	2,5l/ha	300-600l/ha	od fázy 5. listu ďalej preventívne	4x	7-14 dní
	<b>šetrné</b>	Neemazal-T/S-insekticíd	pásavka zemiaková	2,5l/ha	500-700l/ha	pri prvom výskyte - I. a II. Instar(ked kvitne púpava)	2x	7 dní
	<b>EPV</b>	Fertipen C-hnojivo	škvritosť	2l/ha	400-800l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7 dní
	<b>EPV</b>	Tradecorp Fe	chloróza	100-250g/ha max 1kg	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rastu	4x	7-10 dní
	<b>EPV</b>	Tradebor Mo	hnojivo	2-3l/ha	min 150l/ha	pri dostatočnej listovej ploche pred zapojením riadkov	1x	

Baklažán	šetrné/EPV	produkt	účel použitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní
	šetrné	Spintor-insekticíd	strapky	0,04%	600-800l/ha	ihneď po vyliahnutí húseníc	2x	10 dní
jahody	šetrné/EPV	produkt	účel použitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.
	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní
	EPV	Fertipen C-hnojivo	škvrnitosť	1-1,5l/ha	400-800l/ha	po zbere plodov	2x	10-14 dní
	EPV	Fertipen S-hnojivo	hnojivo s obsahom Síry	5-6l/ha	250-1000l/ha	od 5. pravých listov do zrenia plodu	6x	10 dní
	EPV	nematop-bioagens	nosánik	50 mil.jed. / 100m <sup>2</sup>	400l/ha	zalievanie	<del></del>	<del></del>
	šetrné	Vitisan-fungicíd	múčnatka	3kg	500-1000l/ha	od prvého mladého listu po staré listy	8x	7-10 dní
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora	1kg/ha	300-1000l/ha	aplikácia v I. a II. Instare		7-10 dní

Všetky plodiny	šetrné/EPV	produkt	účel použitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap	interval m. ap.
	EPV	Fertipen S-hnojivo	výživa Síra	5l/ha	250-1000l/ha	výška porastu cca 15cm	6x	10-14 dní
	EPV	FREE N-hnojivo	živé mikroorganizmi	0,5l/ha	150-400l/ha	od fázy 2. pravého listu	1x	
	EPV	FREE PK-hnojivo	živé mikroorganizmi	0,5l/ha	150-400l/ha	od fázy 2. pravého listu	1x	
	EPV	Nutrigeo L	anorganické hnojivo s obsahom mikroživín	40l/ha	100-200l/ha	pred sejbou/po sejbe	1x	
	EPV	VermiFit A-hnojivo	hnojivo	2-5l/ha	200-600l/ha	počas celej doby vegetácie	2-5x	10 dní
	EPV	rizocore	živé mikroorganizmi					
	EPV	Wetcit	zmáčadlo	0,05%	min.100l/ha	počas celej doby vegetácie		
	EPV	Heliosol	zmáčadlo	0,5% s herb.a regulátor0,2% fungi.a insekt		počas celej doby vegetácie		
	EPV	Tradecorp Fe	hnojivo	200-300g/ha max 1kg/ha	min. 200l/ha	2x pred kvetom, 2-3x po kvete	5x	7-10 dní
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	2-3l/ha	min 150l/ha	aplikácia pri dostatočnej listovej ploche, v priebehu rast pred kvetom	2x	10-14 dní

### šetrné - prípravky sú v zozname pre šetrné hospodárstvo

EPV - prípravky sú schválené a certifikované pre ekologické poľnohospodárstvo

[usmernenie ministerstva pôdohospodárstva](#)